



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Erythro-Oxytin Plus



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

Water Soluble Powder

INDICATIONS:

Erythro-Oxytin Plus is an effective combination of broad-spectrum antibiotics and vitamins. It stimulates egg production, enhances growth, improves feed conversion, and serves as a vitamin supplement during periods of illness and stress. It is effective against infectious and intestinal diseases, as well as respiratory and urinary infections caused by bacteria sensitive to Oxytetracycline, Erythromycin, and Colistin, such as Bordetella, Campylobacter, Escherichia coli, Lactobacillus, Mycoplasma, Paramyxovirus, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus, and Streptococcus. It is used in poultry, calves, sheep, goats, horses, cattle, and rabbits.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1g per 2 liters of drinking water for 5-7 days.

Calves, Sheep, Goats: 1g per 5kg body weight daily for 5-7 days.

Note: A fresh solution should be prepared daily with clean drinking water.

Contraindications:

Do not use in cases of hypersensitivity to Oxytetracycline, Erythromycin, or Colistin. Avoid use in animals with impaired liver or kidney function.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Oxytetracycline Hydrochloride 50mg, Erythromycin Thiocyanate 35mg, Colistin Sulfate 225,000 IU, Streptomycin Sulfate 35mg, Vitamin A 3,000 IU, Vitamin D3 (Cholecalciferol) 1,500 IU, Vitamin E (Acetate) 2mg, Vitamin K3 (Menadiolone Sodium Bisulfite) 2mg, Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride) 2mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 4mg, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) 2mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 10mcg, Vitamin C (Ascorbic Acid) 20mg, Nicotinic Acid 20mg, and Pantothenic Acid 10mg.

WITHDRAWAL PERIOD:

Meat: 3 days before slaughter.

Milk: 24 hours before consumption.



500 gm



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

إريثرو-أوكسيتين بلس

Pharmaceutical



>



Cow



Poultry

>



Goat



Lamb

بودرة قابلة للذوبان في الماء

الخواص العلاجية والإستطابات:

إريثرو-أوكسيتين بلس هو مزيج فعال من المضادات الحيوية واسعة الطيف والفيتامينات، حيث يحفز إنتاج البيض، ويزيد النمو، ويحسن تحويل الغذاء، ويستخدم كمكمل فيتامينات خلال فترات المرض والإجهاد. كما أنه فعال ضد الالتهابات المعدية والموعية والتهابات الجهاز التنفسي والبولي الناتجة عن بكتيريا حساسة للأوكسي تتراسيكلين، والإريثروميسين، والكوليسيتين، مثل البورديتيلاء، الكامبيلوباكتر، الإشريكية القولونية، الليكوباكيللا، الميكوبلازما، الباراميكسفير، الريكتسيا، السالمونيلا، المكورات العنقودية، والمكورات العقدية، ويستخدم في الدواجن، العجول، الأغنام، الماعز، الخيول، الأبقار، والأرانب.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

للاستخدام الفموي عبر مياه الشرب:
الدواجن: ١ غرام لكل ٢ لتر من مياه الشرب لمدة ٥ - ٧ أيام.
العجول، الأغنام، الماعز: ١ غرام لكل ٥ كغ من وزن الجسم يوميًا لمدة ٥ - ٧ أيام.
ملاحظة: يجب تحضير محلول جديد يوميًا من مياه الشرب الطازجة.

موانع الاستعمال:

يمنع استخدامه في حالة فرط الحساسية للأوكسي تتراسيكلين، الإريثروميسين، أو الكوليسيتين. كما يمنع في الحيوانات التي تعاني من خلل في وظائف الكبد والكلية.

التركيبية :

كل ١ غرام يحتوي :
أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد ٥٠٠ ملغ، إريثروميسين ثيوسيانات ٣٥ ملغ، كوليسيتين سلفات ٢٢٥٠٠٠ وحدة دولية، ستريptomيسين سلفات ٣٥ ملغ، فيتامين أ ٣٠٠٠ وحدة دولية، فيتامين ب٣ (كوليالكسيفيرول) ١٥٠٠ وحدة دولية، فيتامين هـ (أسيات) ٢ ملغ، فيتامين ك٣ (ميناديون ثنائي سلفيت الصوديوم) ٢ ملغ، فيتامين ب١ (ثيامين هيدروكلوريد) ٢ ملغ، فيتامين ب٢ (ريبوفلافين) ٤ ملغ، فيتامين ب٦ (بيريدوكسين هيدروكلوريد) ٢ ملغ، فيتامين ب١٢ (سيانوكوبالامين) ١٠ ميكروغرام، فيتامين ج (حمض الأسكوربيك) ٢٠ ملغ، حمض النيكوتينيك ٢٠ ملغ، وحمض البانتوثينيك ١٠ ملغ.

فترة السحب :

اللحم: ٣ أيام قبل الذبح.
الحليب: ٢٤ ساعة قبل الاستهلاك.



٥٠٠ جرام



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)