



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية


The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

MOVE SULFACLOZINE



>



>

Poultry

Powder - for Treatment of Coccidiosis, Salmonellosis and Cholera Infections

INDICATIONS:

Move-Sulfaclozine: is a sulfonamide antibiotic, used for treatment of Coccidiosis in poultry caused by Eimeria species such as necatrix, maxima, acervulina, mitis, tenella, brunetti, praecox, adenoides, meleagridis, Salmonellosis caused by Salmonella (gallinarum, pullorum, enteritidis, typhimurium) and Pasteurelosis (Pasteurella multocida).

Move-Sulfaclozine: for treatment of infectious coryza

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry:

For treatment of Coccidiosis: 1 gm/L of drinking water (equivalent to 50 mg sulfachloropyrazine/kg of body weight)

For periodic treatment of Coccidiosis: 1 gm/L of drinking water (shuttle programs in days 1,3,5,7,9 or 1,2,5,6,9 are effective)

For treatment of Salmonellosis and Pasteurellosis: 1-2 gm/L of drinking water, for 5 days at least.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Sulfachloropyrazine Sodium 300 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

Meat & Eggs: 14 days.



500 gm



(below 30°C)




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

موفي-سلفاكلوزين



>



>

Poultry

Pharmaceutical

بودرة - يستخدم لعلاج الكوكسيديا والسالمونيلا والكوليرا

الخواص العلاجية والإستطابات:

موفي-سلفاكلوزين: مضاد حيوي ينتمي إلى مجموعة السلفوناميدات يستخدم لعلاج الكوكسيديا في الدواجن التي تسببها أنواع الكوكسيديا مثل: إيميريا نيكاتريكس، ماكسيما، اسيرفولينا، مايتس، تينيللا، برونتي، براكوكس، ادنيويس، ملجيرمايتس، وداء السالمونيلا الفاجع عن الإصابة بالسالمونيلا (جالنيرم و بلورم و انتراتيديس و تايفيميوريم) وداء الباستوريلا (الباستوريلا مالتوسيدا)،
موفي-سلفاكلوزين: علاج حالات الزكام المعدي

التركيبية :

كل ١ غم يحتوي :

سلفا كلورو بيرازين الصوديوم ٣٠٠ ملغم

فترة السحب :

اللحم والبيض : ١٤ يوم

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن:

علاج الكوكسيديا: ١ غم /لتر من ماء الشرب (ما يعادل ٥٠ ملغم من سلفا كلورو بيرازين/كغم من وزن الجسم)

المعالجة الدورية للكوكسيديا: ١ غم/لتر من مياه الشرب (برامج المكوك في أيام ١٣،٥٧،٩ أو ١٤،٢٠،٦،٩ فعالة).

لمعالجة داء السالمونيلا وداء الباستوريلا: ١-٢ غم/لتر من ماء الشرب، لمدة ٥ أيام على الأقل



٥٠٠ غم



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)