



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

MODEXINE 2%



Фармацевтическая

Пероральный раствор через питьевую воду

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Modexine 2% применяется как отхаркивающее средство при лечении заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся задержкой слизистого секрета, таких как бронхит.

Также используется как вспомогательная терапия при лечении бронхопневмонии у лошадей, крупного рогатого скота, собак и кошек, а также при лечении аспирации амниотической жидкости у новорожденных животных.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Птица: 1 мл на 2 литра питьевой воды в течение 3–5 дней.

Крупный рогатый скот: 1 мл на 10 кг массы тела в течение 5–7 дней.

Лошади: 1–2,5 мл на 50 кг массы тела в течение 5–7 дней.

Домашние животные (собаки и кошки): 0,5–1 мл на 5 кг массы тела в течение 5–7 дней.

СОСТАВ:

Каждый 1 мл содержит:
Бромгексина гидрохлорид — 20 мг

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

отсутствует.



1000 мл



(ниже 30 °C)