



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

НОВЫЙ

PROGSTREEN



Кошки



Собаки



Гормональные таблетки для перорального применения для собак и кошек

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Таблетки PROGSTREEN для собак и кошек содержат мегестрола ацетат, применяемый для:

- контроля течки (эструсы) и лечения аллергического дерматита и эозинофильной гранулемы (клубы гризуюны) у кошек;
- отсрочки или предотвращения течки, лечения ложной беременности и эстроген-зависимых опухолей молочной железы у сук;
- предотвращения нежелательной беременности у самок собак и кошек;
- перорального применения у кобелей для лечения гиперсексуальности, проявляющейся в виде нежелательного поведения.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Собаки (самки):

Отсрочка течки (эструсы):

0,5 мг на кг массы тела один раз в сутки, в течение максимум 40 дней, в соответствии с таблицей дозирования.

Курс приема таблеток рекомендуется начинать за 14 дней до предполагаемой течки.

Допускается проведение нескольких курсов отсрочки, при условии, что суке не назначают препарат более двух раз в течение 12 месяцев.

Масса (кг)	Доза (таблетка 5 мг)
6 - 10	1
16 - 20	2
21 - 30	3
31 - 40	4
41 - 50	5

Профилактика течки (подавление эструсы):

При стандартной схеме дозирования: назначают 2 мг на кг массы тела один раз в сутки в течение 8 дней, согласно таблице дозирования. Курс лечения следует начинать в начале проэструсы, при наличии кровянистых выделений и отека вульвы.

Стадию эстрального цикла рекомендуется подтверждать путем исследования мазков из влагалища.

Масса (кг)	Доза (таблетка 5 мг)
2,5 - 5	2
6 - 7,5	3
8 - 10	4
11 - 15	5

При удлиненной схеме дозирования:

Назначают 2 мг на кг массы тела ежедневно в течение 4 дней, затем 0,5 мг на кг ежедневно в течение 16 дней, согласно таблице дозирования.

Применение данной продленной схемы профилактики

рекомендуется:

- у сук в первую течку,
- у животных с анамнезом ложной беременности,
- в отдельных случаях при нарушениях эстрального цикла,
- в также при содержании суки совместно с другими самками.

Масса (кг)	Доза (таблетка 5 мг)
В течение 4 дней	
2,5 - 5	2
6 - 7,5	3
8 - 10	4
11 - 15	5
В течение 16 дней	
6 - 10	1
16 - 20	2
21 - 30	3
31 - 40	4
41 - 50	5

Собаки (самцы):

Для коррекции нежелательного поведения рекомендуется пероральное применение препарата в целом виде или в измельченном виде, смешанном с кормом.

Начальная доза: 2 мг/кг массы тела ежедневно в течение 7 дней.

Поддерживающая терапия:

- При улучшении: 1 мг/кг ежедневно в течение 14 дней
- При отсутствии улучшения: 4 мг/кг ежедневно в течение 7 дней

Кошки (самки):

Контроль течки:

Отсрочка эструсы: по 1 таблетке на кошку 1 раз в неделю до 15 недели. Применение следует начинать в анаэструсе (внеполовой сезон).

Профилактика эструсы: по 1 таблетке на кошку ежедневно в течение 3 дней, начиная при появлении признаков половой охоты.

Лечение аллергического дерматита и эозинофильной гранулемы (клубы гризуюны):

Рекомендуемая доза — 1 таблетка на кошку каждые 2-3 дня, до начала регресса поражения, затем 1 раз в неделю до достижения клинического улучшения.

В некоторых случаях может потребоваться поддерживающая доза — 2,5 мг на кошку 1 раз в неделю или 1 раз в две недели для предотвращения рецидива.

СОСТАВ:

Каждая таблетка содержит:
Мегестрола ацетат — 5 мг.

Период вывода препарата:
Отсутствует



120 таблеток



(ниже 30°C)