



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Flafen

فلافين

Гербицид



Гербицид

Herbicide

Гербицид в форме концентрата, пригодного для эмульгирования

Селективный гербицид контактного действия для борьбы с однолетними двудольными и некоторыми злаковыми сорняками до прорастания, предназначенный для применения в посевах лука, чеснока, фруктов, винограда, капусты и брокколи.

Способ применения:

Культура	Норма применения/Дюном	Норма применения/Дюном
Лук (семена)	5-10 мл	Лёгкий полив сразу после посева. После обработки (опрыскивания) необходимо провести полив.
	150 мл	Лёгкий полив сразу после посева. Первое опрыскивание с нормой 150 мл/дюном, после чего проводится полив культуры. Второе опрыскивание через месяц после первого с нормой 150 мл/дюном.
Лук — ранние сорта	100 мл	Первое опрыскивание (в случае наличия проволочистых сорняков на поле) проводится сразу после посева с лёгким поливом культуры. После обработки опрыскиванием необходимо провести полив культуры. Второе опрыскивание через месяц после первого с нормой 100 мл/дюном.
	150 мл	Первое опрыскивание (в случае наличия проволочистых и тонколистных сорняков в поле) проводится сразу после посева с лёгким поливом культуры. После обработки опрыскиванием необходимо провести полив культуры. Второе опрыскивание через месяц после первого с нормой 150 мл/дюном.
Чеснок	300 мл	Лёгкий полив сразу после посева. После обработки опрыскиванием проводится полив культуры.
Капуста, Цветная капуста, Брокколи	200-300 мл	Препарат используется на хорошо подготовленной почве за 4-7 дней до пересадки рассады. Лёгкий полив почвы перед посадкой и полив культуры после посадки.
Сенцевые культуры, Кустовые культуры	300-400 мл	До появления сорняков используется как профилактическое средство для опрыскивания поверхности почвы в конце осени и начале зимы. Более высокая концентрация применяется весной.
Цитрусовые	300-400 мл	Опрыскивание наносится на поверхность почвы после появления сорняков и проводится вне периода от 3 недель до цветения до 3 недель после завязывания плодов.
Виноград	300-400 мл	Не использовать препарат на деревьях или виноградниках моложе 3 лет. Опрыскивание проводить в период покоя.

Состав:

Оксихлорфен 240 г/л.

Противоядие: отсутствует

Период запрета входа в поле:
24 часа



1000 мл



(ниже 30°C)