



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Glusit

جلوسيت



Гербицид

Herbicide

Гербицид

Гербицид в форме водорастворимого концентрата

Неселективный контактный гербицид, применяемый для борьбы с однолетними и многолетними сорняками, как двудольными, так и злаковыми. Первые видимые эффекты появляются через 3–7 дней после обработки, но полная гибель обработанных сорняков может занять от 20 до 30 дней в умеренных климатических условиях.

Способ применения:

Культура		Норма применения	
Ягоды	Нежелательные разрастания у основания и присосок	500 мл на 100 литров воды	Опрыскивание следует направлять на эти разрастания и присоски, избегая обработки вегетативных частей и плодов. Оптимально проводить опрыскивание, когда длина этих разрастаний и присосок менее 15 см.
«Авокадо, бинан, гуайава, клин, манго, папайя, апельсин, лимон, грейпфрут, абрикос, айва, миндаль, абрикос, персик, вишня, слива, фундук, томаты между бороздами, клубника, виноград»	Однолетние и многолетние травы	1–5 литров на гектар, количество используемой воды: Равномерное опрыскивание: используют от 500 до 1000 литров воды на гектар, в зависимости от плотности обрабатываемых сорняков. Механические (самоходные) опрыскиватели: используют от 300 до 500 литров воды на гектар при нормальных условиях.	Опрыскивание следует направлять на сорняки, подлежащие уничтожению, избегая попадания капель пестицида на зеленые части и стебли растений. Допускается опрыскивание гербицидом в приствольной зоне деревьев возрастом до двух лет.
Незасеянные земли	Однолетние и многолетние травянистые растения	1–6 литров на гектар, количество используемой воды: Равномерное опрыскивание: используют от 500 до 1000 литров воды на гектар, в зависимости от плотности обрабатываемых сорняков. Механические (самоходные) опрыскиватели: используют от 300 до 500 литров воды на гектар при нормальных условиях.	

Состав:

Глюфосинат аммония: 20% масса/объем.

Противоядие: отсутствует.

Срок ограничения выхода в поле: 24 часа.



1000 мл



(ниже 30°C)