

BINZEEN 48%

بنزين ٤٨%



инсектицид

Insecticide

Концентрированный суспензионный инсектицид (эмulsion)

Селективный акарицид для борьбы с растительноядными клещами, поражающими такие культуры, как: яблоня, груша, абрикос, нектарин, персик, миндаль, а также плодовые овощи, включая томаты, перец, паприку, баклажаны, тыквенные культуры, клубнику. При применении на листьях растений препарат быстро уничтожает вредителей благодаря прямому контактному действию. Обладает хорошим остаточным эффектом. Благодаря уникальному химическому составу, механизму действия и высокой селективности, препарат не оказывает негативного влияния на полезных насекомых. Совместим с программами интегрированной защиты растений.

Способ применения:

Культура	Вредитель	Норма применения	Срок окидания (период безопасности)	Примечания
Яблоня и груша	Двухголовый красный клещ, Европейский красный клещ, Коричневый красный клещ	65 мл на 100 литров воды	Срок окидания перед сбором урожая — 7 дней, срок окидания перед выпасом — 28 дней	
Айва, Нектарин, Персик, Слива	Двухголовый красный клещ, Европейский красный клещ, Коричневый клещ	65 мл на 100 литров воды	Срок окидания перед сбором урожая — 3 дней, срок окидания перед выпасом — 28 дней	
Миндаль	Двухголовый красный клещ, Коричневый клещ	65 мл на 100 литров воды	Срок окидания перед сбором урожая — 14 дней, срок окидания перед выпасом — 28 дней	
Плодовые овощи: помидоры, перцы, тыквенные (за исключением сладкой кукурузы и грибов)	Двухголовый красный клещ, Европейский красный клещ, Коричневый клещ	65 мл на 100 литров воды	1 день	Применять непосредственно в местах перенесения вредителя с помощью их обдуванием. Обдувование должно быть отклонено так, чтобы распылять не излишне много препарата на листья. Периодически все листья обогащают. В каждом сезоне проводится только одна обработка.
Тыквенные культуры за исключением огурцов	Двухголовый красный клещ, Коричневый клещ	65 мл на 100 литров воды	3 дня	
Огурцы	Двухголовый красный клещ, Коричневый клещ	65 мл на 100 литров воды	1 день	
Клубника	Двухголовый красный клещ, Европейский красный клещ, Коричневый клещ	65 мл на 100 литров воды	1 день	Не проводите обработку более двух раз за сезон, интервал между обработками должен составлять 21 день. Между применениями можно использовать пестициды из разных групп.

Состав:
Байфензит 480 г (вес/объем).

Противоэанс: отсутствует.

Запрет на вход в обработанное поле: Вход на опрысканное поле запрещён до полного высыхания препарата, за исключением случаев использования защитной одежды.



1000 مل



(нед 30°C)