شركة الحديثــة لصناعة الأدوية البيطريــة و المبيــدات الزراعيــة

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Move-Oxamyl 24

موف -اوكساميل ٢٤

INSECTICIDE

Инсектицид

Инсектицид

Инсектицид в виде концентрата, растворимого в воде

Инсектицид контактного действия, который проникает через листья и корни растения.

Способ применения:

культура	Продукт	Норма применения (л/га)	Срок ожидания (норма безопасности)	Время применения	Примечания
Яблоня	Тля с яблони	Листовая обработка 0,5-1,0 кг/ 20 л	14 дней	Обработка проводится перед цветением (перед распусканием почек). Обработка повторяется при появлении заболевания.	Не разрешается опрыскивание в период цветения или в течение 10 дней после цветения. Не более 4 обработок препаратом разрешено в течение сезона, рекомендуется чередовать с инсектицидами другой группы. Не допускается попадание на обрабатываемые участки. Повторная обработка возможна не ранее чем через 7 дней после последней обработки.
	Агроминка	Листовая обработка 0,5 л/ 20 л		Для сохранения полезных (рекомендуется обработку проводить в ранние вечерние часы) и минимуму обработку осуществляют через 5-14 дней после первой.	
	Европейский плодовый клещик	Листовая обработка 0,5-0,7 кг/ 20 л		Обработку проводят при обнаружении 2-4 взрослых особей, а минимуму обработку осуществляют через 5-14 дней после первой.	
	Двухточечный паутинный клещик	Листовая обработка 0,5-0,7 кг/ 20 л			
	Цикада	Листовая обработка 0,5-0,7 кг/ 20 л		Обработку проводят при появлении признаков заболевания, а минимуму обработку осуществляют через 10-14 дней после первой.	
	Семена хлопка	Листовая обработка 70-100 кг/ 20-100 л 20-100 л воды		Обработка проводится при появлении первых всходов (рекомендуется обработка почвы перед обработкой (предпосевная обработка) и обработка растения при обнаружении первых признаков заболевания, минимум обработку осуществляют после каждого полива.	
Хмель, Аквилегия, Помело, Грейпфрут, Клементин и Цитрус	Предупреждение паутинный клещ	Листовая обработка 0,75 кг/л	7 дней	Листовая обработка 0,75 кг	Не разрешается использование препарат более 6 раз за сезон. Не разрешается использовать инсектицид в обработанных зоны и проводить опрыскивание по обработанным зонам. Проводить добавление в системы капельного орошения или в другие системы, таких как гидропонная, которые являются исходными этапом орошения. Повторную обработку проводят не ранее, чем через 14 дней после последней обработки.
	Трипсы	Листовая обработка 0,75 кг/л		Листовая обработка 0,75 кг/л	
	Паутинные клещуновые	В системы капельного орошения 0,75 кг/л		В системы капельного орошения 0,75 кг/л	
Вишня, Персик, Грушa	Клещи, Тля, Слепни	Листовая обработка 50-150 кг/л	14 дней	Листовая обработка 50-100 кг/л	Не разрешается использовать препарат более 2 раз за сезон или 4 обработки за сезон, включая обработки почвы. Повторную обработку проводят не ранее, чем через 14 дней после последней обработки. Опрыскивание запрещено в случае, если растения подвержены стрессу. Рекомендуется чередовать этот препарат с другими средствами из разных групп.
	Паутинные	Листовая обработка 50-100 кг/ 20 л воды		Листовая обработка 50-100 кг/ 20 л воды. Обработка почвы перед посадкой(1 л/ 20 л воды)	
	Семена хлопка	Листовая обработка 70-100 кг/ 20 л 20-100 л воды		Листовая обработка 70-100 кг/ 20-100 л воды	

культура	Продукт	Норма применения (л/га)	Срок ожидания (норма безопасности)	Время применения	Примечания
Огурец, Дыня, Арбуз, Кабачок и Тыква	Паутинные клещи	Обработка почвы до посадки 0,5 кг/ 20 л воды	3 дня	———————	В случае интенсивного распространения вредителя рекомендуется опрыскивание проводить с другими средствами из разных групп. Внимание проверять в почву на наличие на растениях. Не разрешается проводить более 2 опрыскиваний за сезон или более 3 обработок за сезон.
		Листовая обработка 0,5 кг/ 20 л воды		Первая обработка проводится через 2-4 недели после посадки, затем обработка — через 2-3 недели после первой.	
		В системы капельного орошения и внесения в почву 0,5 кг/ 20 л воды		Обработка почвы проводится по краям перелопаченных мест в течение 14 дней после перелопаты. При необходимости обработку повторяют второй раз с интервалом 10-14 дней между первой обработкой.	
	Агроминка, Тск. Трипс	Листовая обработка 0,5 кг/ 20 л воды		Первая обработка проводится через 2-4 недели после посадки, а при необходимости между обработку проводят через 7 дней после первой.	
		В системы капельного орошения и внесения в почву (для стимулирования) 0,5 кг/ 20 л воды		Обработка почвы проводится по краям перелопаченных мест в течение 14 дней после перелопаты. При необходимости обработку повторяют второй и третий раз с интервалом 10-14 дней. Обработка растения проводится при появлении признаков, повторную обработку проводят через 10-21 дней.	
Баклажан (aubi)	Тля, Клещевинная, прыг	Листовая обработка 0,5 кг/ 20 л воды	3 дня		Обработка почвы проводится на глубину 5 см через 2-3 недели после перелопаты рассады, а минимум обработку проводят через 2-4 недели после первой. Повторную обработку проводят по рамам, так через 10 дней после последней обработки. Не разрешается проводить более 2 опрыскиваний за сезон или более 4 обработок за сезон. Повторную обработку проводят по рамам, так через 7 дней после последней обработки.
	Паутинные	Обработка почвы 0,5 кг/ 20 л воды	7 дней	Обработка почвы проводится по краям перелопаченных мест, а минимум после первой.	
		Листовая обработка 0,5 кг/ 20 л воды		Обработка проводится дважды: первая обработка через 20-14 дней, второй — через 2-4 недели после первой.	
		В системы капельного орошения и внесения в почву 0,5 кг/ 20 л воды		Проводят внесение в почву по глубину 5 см	
Чеснок	Зеленая трипсы, Цветочные трипсы	Обработка в почвы в цветочных трипсами 0,5 кг/ 20 л воды	14 дней	Обработка проводится при появлении 1-2 трипсов на растении	
Перец,Лук	Паутинные клещи	Обработка рассады 0,5 кг/ 20 л воды	7 дней	Обработка рассады по краям перелопаты	
		Опрыскивание растения 0,5 кг/ 20 л воды		———————	
Шалфей	Паутинные, паутинные клещевые на корни	Обработка почвы до и после посадки (1 л/ 20 л воды)	14 дней	Обработка первой проводится до высадки до посадки или до всходов растения, если обработка была выполнена после посадки по глубину 5 см	Не разрешается добавлять препарат непосредственно в почву более 2 раз за сезон. Повторную обработку проводят более 2 раз за сезон. Повторную обработку проводят по рамам, так через 14 дней после последней обработки.
		В системы орошения 0,5 кг/ 20 л воды		До появления растения	
		Внесение в почву 0,5 кг/ 20 л воды		Обработка почвы проводится непосредственно на краях посадки в борозды	
	Мучнистые клещи	Обработка почвы 250-500 кг/ 20 л воды		Проводят добавление в почву на глубину 5 см	

СОСТАВ:
Каждый 1 литр содержит:
Оксамила 24 г .

Противоядная:
Атропин, обработка проводится в зависимости от симптомов.

Срок запрета на вход в поле : 24 часа.

1000 мл

(ниже 30 °C)