

PHOXIM MOVE 50%



▼ ▼



корова верблюд



коцы ягнёнок

Эмульсионный концентрат – инсектицид и акарицид

Лечение инфекций, вызванных носовыми мухами (ботами), миазом, чесоткой, клещами, вшами, поцелуйными клопами, а также контроль тараканов и сельскохозяйственных мух.

Дозировка и способ применения:

Способ применения	Животное	Вредитель	Доза
мытьё	Крупный рогатый скот, собаки, коны, лошади, овцы и козы	Вши, мухи, клещи, личинки мух и клещевики	10 мл на 10 л воды против паразитических клещей. Проводится 2 обработки с интервалом 7 дней. При сильном заражении применяется двойную дозу — 20 мл на 10 л воды.
	верблюд	Вши, мухи, клещи, миаз и чесотка	10–15 мл на 10 л воды Однократная обработка
Распыление (готовый раствор)	Крупный рогатый скот / лошади	вши, мух, клещей, личинок мух и паразитических клещей	2–3 литра
	Овца/ козы	вши, мух, клещей, личинок мух и паразитических клещей	2–3 литра
	верблюд	Вши, мухи, клещи, миаз и чесотка	10–15 мл на 10 л воды Однократная обработка
Окупание	овцы	вши, мух, клещей, личинок мух и паразитических клещей	Первичная обработка: 1 л на 1000 л воды Пополнение (поддерживающая обработка): 200 мл на 100 л воды

Состав:

В каждом 1 мл содержится: ФОКСИМ 500 мг.

выводной период:

Мясо крупного рогатого скота: 40 дней.

Мясо овец и коз: 28 дней.

Не использовать у животных в период лактации за 2 месяца до начала доения и не применять во время лактации.



500/ 250/ 100 мл



(ниже 30 °C)