



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Фармацевтическая

Move Sulfadimidine 100%



>



Корова



Курица

>



КОЗЫ



ЯГНЁНОК

Водорастворимый порошок

Показания к применению:

Используется для лечения и контроля:
-Септицемии, пневмонии, различных видов энтерита, стрептококкового мастита.
-Сальмонеллёза, пастереллёза и инфекций кишечной палочки у телят и жеребят.
-Кокцидиоза слепой кишки и коризы у птиц.

Дозировка и способ применения:

Способ применения: перорально с питьевой водой.
Телята: 100 мг/кг массы тела.
Интервал дозирования: каждые 12–24 часа в течение 3–5 дней.
Птица (не несушки и бройлеры): 100 мг/кг массы тела (1 г порошка на 1–2 литра питьевой воды в зависимости от фактического потребления воды).
Острый кокцидиоз: назначают в течение 3 последовательных дней, затем 2 дня без лечения, после чего повторяют курс лечения еще 3 дня.
Субклинический кокцидиоз: назначают в течение 3 последовательных дней.

Меры предосторожности:

Добавьте необходимую дозу в количество воды, которое будет выпито за 1 день. Медикаментозная вода должна быть доступна только в период лечения. Лечение следует продолжать в течение 24–48 часов даже после исчезновения симптомов.

Состав:

Каждый 1 грамм содержит: Натриевая соль сульфадимидина 100%.

Период вывода препарата:

Мясо птицы: 14 дней;
Мясо крупного рогатого скота: 21 день.
Не применять у кур, несущих яйца для потребления человеком.
Не применять у крупного рогатого скота, дающего молоко для потребления человеком.



5000 / 1000 / 500 грамм



(ниже 30°C)