



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Фармацевтическая

Otitis Move -Drops



>



Кошки



Собаки

>

Противопаразитарное, антибактериальное, противогрибковое и противовоспалительное средство

Показания к применению:

Для лечения смешанного наружного отита бактериального, грибкового и паразитарного происхождения, вызванного: бактериями, чувствительными к неомидину; грибами, чувствительными к нистатину; и ушными клещами, чувствительными к перметрину.

Дозировка и способ применения:

Перед началом лечения необходимо очистить наружные слуховые проходы. Флакон с капельницей должен быть размещён вертикально для точного дозирования.

Для взрослых кошек и собак: Ввести 3/5 капельницы (примерно 0,3 мл) в каждое ухо.

Для котят: Ввести 1/5 капельницы (примерно 0,1 мл) в каждое ухо.

Осторожно помассировать основание ушей для равномерного распределения препарата.

Обрабатывать один раз в день в течение 10 дней подряд.

Лечение должно проводиться в обоих ушах, даже если поражённым кажется только одно.

После 10 дней лечения ветеринарный врач должен повторно осмотреть уши.

При необходимости может быть назначен повторный курс лечения.

Состав:

Состав на 1 мл:

Перметрин — 10 мг

Нистатин — 100 000 ME

Триамцинолона ацетонид — 1 мг

Неомицина сульфат — 3500 ME

Период ожидания:

Отсутствует.



10 мл



(ниже 30°C)