



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

НОВЫЙ

MOVECOSIN 25%



>



Корова



Курица

>



Козы



ягнёнок

Фармацевтическая

ПОКАЗАНИЯ:

Куры и индейки: для лечения и профилактики хронических респираторных заболеваний, вызванных *Mycoplasma gallisepticum* и *Mycoplasma synoviae*. Пастереллёз (холера птиц), вызванный *Pasteurella multocida*, а также инфекции, вызванные *Ornithobacterium rhinotracheale*. У телят: применяется для лечения и профилактики респираторных заболеваний крупного рогатого скота, связанных с *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma dispar* или другими возбудителями, чувствительными к тилмикозину.

Дозировка и способ применения:

Куры и индейки (за исключением несушек, производящих яйца для потребления человеком): 3 мл на 10 литров питьевой воды в течение 3 последовательных дней. Препарат должен быть предварительно растворён в питьевой воде и применяться птице в следующих суточных дозах: – для кур: 15–20 мг тилмикозина на кг массы тела, – для индеек: 10–27 мг тилмикозина на кг массы тела в течение 3 дней, что эквивалентно 75 мг тилмикозина на литр питьевой воды. Телята (лактацирующие, не являющиеся жвачными): Movecosin 25% следует смешивать только с заменителем молока. Дозировка: 1 мл на 20 кг массы тела, два раза в день в течение 3–5 последовательных дней (что эквивалентно 12,5 мг тилмикозина на кг массы тела).

СОСТАВ:

Каждый 1 мл содержит:
Тилмикозин (в форме тилмикозинфосфата)
— 250 мг

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Куры — 12 дней
Индейки — 19 дней
Телята — 42 дня



240 мл



(ниже 30 °C)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не применять у кур-несушек, производящих столовые яйца.
Не использовать за 14 дней до начала яйцекладки.