



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Herbicide

Flafen

فلافين



HERBICIDE

مبيد عشبي

مبيد عشبي على هيئة مركز قابل للاستحلاب

التركيبية :

او كسيفلورفين ٢٤٠ غم لكل لتر

الجرعة المضادة:
لا يوجد

فترة تحريم دخول الحقل :

٢٤ ساعة



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)

مبيد عشبي اختياري يعمل عن طريق
الملامسة لمكافحة الأعشاب الحولية
عريضة الأوراق وبعض الأعشاب
رفيعة الأوراق قبل الإنبات للاستعمال
في محاصيل البصل ، الثوم ، الفاكهة،
العنب، الملفوف والزهرة.

طريقة الاستعمال :

محتل الاستعمال / تولم	موعد الاستعمال
١٠٠ مل	- ري خفيف بعد الزراعة مباشرة - بعد تطبيق الرش يتبعها ري للمحصول
١٥٠ مل	- ري خفيف بعد الزراعة مباشرة - رشه أولى بمعدل ١٥٠ مل / دولم يتبعها ري للمحصول - رشه مرة ثانية بعد شهر من الرشه الأولى بمعدل ١٥٠ مل / دولم
١٠٠ مل	- تتم الرش في المرة الأولى (في حالة وجود أعشاب عريضة في الحقل) مباشرة بعد الزراعة وري خفيف للمحصول - بعد تطبيق الرش يتبعها ري للمحصول - رشه مرة ثانية بعد شهر من الرشه الأولى بمعدل ١٠٠ مل / دولم
١٥٠ مل	- تتم الرش في المرة الأولى (في حالة وجود أعشاب عريضة ورفيعة في الحقل) مباشرة بعد الزراعة وري خفيف للمحصول - بعد تطبيق الرش يتبعها ري للمحصول - رشه مرة ثانية بعد شهر من الرشه الأولى بمعدل ١٥٠ مل / دولم
٣٠٠ مل	- ري خفيف بعد الزراعة مباشرة - بعد تطبيق الرش يتبعها ري للمحصول - يستعمل المبيد على التربة المحسنة جيداً قبل نقل الشتلات إليها من ٤ - ٧ أيام - ري التربة ري خفيف قبل الزراعة وري المحصول بعد الزراعة
٣٠٠ - ٤٠٠ مل	- قبل ظهور الأعشاب يستعمل كعامل وقائي لرش على سطح التربة في آخر فصل الخريف وحتى بداية فصل الشتاء - يستعمل التركيز الأعلى في فصل الربيع - يتم تطبيق الرش على سطح التربة بعد ظهور الأعشاب ويبعد عن الفترة ٣ أسابيع من الزهر و ٣ أسابيع عن عقد الثمار
٣٠٠ - ٤٠٠ مل	- لا يستخدم المبيد في الانتشار أو الكروم التي يقل عمرها عن ٣ سنوات - يتم تطبيق الرش خلال مرحلة السكون