



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Herbicide

Glusit

جلوسيت



HERBICIDE

مبيد عشبي

مبيد عشبي على هيئة مركز قابل للذوبان في الماء

طريقة الاستعمال :

المحصول	الأعشاب المعاملة	الجرعة المستخدمة	ملاحظات
التوت	النموات غير المربوبة بها عند القاعدة والمعات	١٠٠ / مل / ١٠٠ لتر ماء	يجب توجيه الرش لوجه النموات والمعات وتجنب رش الأجزاء الخضراء والثمار ويفضل القيام بعملية الرش عندما تكون هذه النموات والمعات بطول أقل من 15 سم.
الافوكادو، الموز، الجوافة، الكيوي، المانجو، البابايا، البرتقال، الليمون، الحبيب فروت، التفاح، الأاجاص، الفسرجل، الأوز، المشمش، الدراق، الكرز، الخوخ، التين، التوتيرة بين الأنلام، الفراولة، المنب.	الأعشاب الحولية والمعصرة	كمية الماء المستخدمة: - المرشات الظهرية: يستخدم من ١٠٠٠-٥٠٠ لتر ماء/ هكتار وتتمدد كمية الماء على كثافة الأعشاب المعاملة. - المرشات الالية: يستخدم من ٥٠٠-٢٠٠ لتر ماء/ هكتار تحت الظروف الطبيعية	يجب توجيه الرش على الأعشاب المراد مكافحتها وتجنب تطاير رذاذ المبيد على الأجزاء الخضراء والساق كما يمكن رش المبيد حول الأشجار بعمق ١٥ سم أقل
الأراضي غير المزروعة	الأعشاب الحولية والمعصرة	كمية الماء المستخدمة: - المرشات الظهرية: يستخدم من ١٠٠٠-٥٠٠ لتر ماء/ هكتار وتتمدد كمية الماء على كثافة الأعشاب المعاملة. - المرشات الالية: يستخدم من 300-500 لتر ماء/ هكتار تحت الظروف الطبيعية	

التركيبية :

جلوفوسينيت أمونيوم: ٢٠٪ (و/ح)

الجرعة المضادة:
لا يوجد

فترة تحريم دخول الحقل :

٢٤ ساعة

مبيد عشبي غير
اختياري يعمل بالملامسة
يستعمل لمكافحة
الأعشاب الحولية
والمعصرة عريضة
ورقيقة الأوراق..
تبدأ ظهور نتائج
المكافحة الفعلية بعد
٧-٣ أيام، لكن نتائج
المكافحة الكاملة
للأعشاب المعاملة يمكن
ان تأخذ فترة ٢٠-٣٠
يوم في الأجواء المعتدلة.



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)