




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agrictlural Pesticides Industries

# Ciprodern Plus



Pharmaceutical

## Broad Spectrum Antibiotic

### INDICATIONS:

Ciprofloxacin has a broad range of lethal effect on most types of gram-negative bacteria (which include E. coli, salmonella, Klebsiella, Hemophilus, Pasteurella, pseudomonas) and gram-positive bacteria (Clostridia, Staphylococcus, Streptococcus, Chlamydia and Mycoplasma) that affect the pulmonary system, digestive system, and reproductive system.

Ciprodern Plus contains bromhexine, which enhances its effect and removes congestion in the upper respiratory tract and dissolves and expels mucous secretions.

### DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1 ml per 4–2 liters of drinking water for 5–3 days.

Calves, goats and sheep: 0.5 ml per 40–20 kg of body weight for 5–3 days.

### COMPOSITION:

Each 1 ml contains:

Ciprofloxacin 200 mg

Bromhexine Hydrochloride 20 mg

### WITHDRAWAL PERIOD:

For meat: 7 days




1 Liter



( below 30o C )

## سيبرو ديرن بلص



مضاد حيوي واسع الطيف

### دواعي الاستعمال:

سيبروفلوكساسين له مدى واسع من التأثير القاتل على معظم أنواع البكتيريا سالبة الغرام والتي تشمل (الإيكولاي، السالمونيلا، الكليسيلا، الهيموفيلس، الباستيريا، الزائفة الزنجارية) والبكتيريا موجبة الغرام: (الكلوستريديا، المكورات العنقودية، العقديّة، الكلاميديا والمايكوبلازما) التي تصيب الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي. يحتوي سيبرو ديرن بلص على برومهيكسين الذي يعزز من فعاليته ويعمل على إزالة الاحتقان في الجهاز التنفسي العلوي وإذابة وطرّد الإفرازات المخاطية.

### الجرعة وطريقة الاستخدام:

الدواجن: ١ مل لكل ٢-٤ لتر من ماء الشرب لمدة ٣-٥ أيام.  
العجول، الماعز والأغنام: ٠,٥ مل لكل ٢٠-٤٠ كغم من وزن الجسم لمدة ٣-٥ أيام.

### المكونات:

سيبروفلوكساسين ٢٠٠ ملغم  
برومهيكسين هيدروكلورايد ٢٠ ملغم

### فترة السحب :

للحوم : ٧ أيام



١ لتر



( أقل من ٣٠٠ درجة مئوية )