



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

## MOVE-GS- 441524



Cat

### Tablets For treatment of Feline Infectious Peritonitis (FIP) in cats

#### PROPERTIES AND INDICATIONS:

Feline infectious peritonitis is an immune-mediated disease, causes a cat's immune system to overreact, triggering an inflammatory response that damages blood vessels in the body and causes significant swelling of the organs. There are two forms of FIP, which cause different symptoms. FIP in cats can be either wet or dry. The Wet FIP refers to fluid buildup within the cat's body, primarily the chest and abdomen. This leads to breathing issues and swelling. And the Dry FIP refers to the development of significant inflammation in various organs like the brain and eyes. Cats with FIP have a variety of symptoms. These symptoms can vary greatly between cats depending on how their immune systems react to the virus. The early symptoms of both dry and wet feline infectious peritonitis include weight loss, diarrhea, decreased appetite, fever, and lethargy.

Move-Gs-441524 is an oral tablet intended for cats for treatment diagnosed with Feline Infectious (FIP), which has demonstrated significant effectiveness in supporting the treatment of various forms of FIP in cats.

#### DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Move-Gs-441524 is recommended to give the pills on an empty stomach or 2 hours after a meal. The pills can be given directly into the cat's mouth using a pill shooter or you can crush the tablets and mix the powder with a small amount of water and wet food. Do not mix with the entire meal. You can offer food to your cat for 2-1 hours after giving the pills.

It is important to treat the cat for 84 days and wait for all the existing viruses to die off naturally before stopping treatment.

The following table shows how to use Move-Gs-441524 for your cat at a dose rate of 15 mg of Gs-441524 per kg of body weight for 12 consecutive weeks:

#### DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Tablet strength: 45 mg		
Body weight (kg)	Number of tablets (per day)	Duration
3 Kg	1 tablet	For 12 weeks
6 Kg	2 tablets	For 12 weeks

#### COMPOSITION:

Each tablet contains:

GS-45 441524 mg



30 tablets



(below 30 °C).



**شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية**  
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

موفي-جي إس-٤٤١٥٢٤



Cat

**أقراص لعلاج التهاب الصفاق المعدي لدى القطط**

**الجرعة وطريقة الاستخدام:**

تركيز الدواء: ٤٥ ملغم	عدد الأقراص (كل يوم)	وزن الجسم (كم)
مدة العلاج	فروض واحد	٣ كيلو
١٢ أسبوع	فروضين	٦ كيلو

**التركيب :**

يحتوي كل قرص على:  
جي إس-٤٤١٥٢٤ ٤٥ ملغم

**الخصائص الاستعمالات:**  
التهاب الصفاق المعدي مرض مناعي، يتسبب في فرط استجابة الجهاز المناعي لدى القطط، مما يؤدي إلى استجابة التهابية تُلحق المضرر بالأوعية الدموية في الجسم وتسبب تورماً كبيراً في الأعضاء. يوجد نوعان من التهاب الصفاق المعدي السنوري، وكل منهما أعراض مختلفة. يمكن أن يكون التهاب الصفاق المعدي السنوري لدى القطط رطاً أو جافاً.

يشير التهاب الصفاق المعدي السنوري إلى تراكم السوائل داخل جسم القطط، وخاصة في الصدر والبطن. وهذا يؤدي إلى حدوث التهاب كثيف في أعضاء مختلفة مثل الدماغ والعينين. الغلاف فيشير إلى حدوث التهاب كثيف في أعضاء مختلفة مثل الدماغ والعينين. تظهر على القطط المصابة بالتهاب الصفاق المعدي السنوري أعراض متعددة. وتختلف هذه الأعراض اختلافاً كبيراً بين القطط اعتماداً على كثافة استجابة جهاز المناعة للفيروس. شملت الأعراض المكثفة لالتهاب الصفاق المعدي السنوري، بنوعيه الجاف والرطب، فقدان الوزن، والإسهال، وقلة الشهية، والحمى، والخمول.

موفي-جي إس-٤٤١٥٢٤ عبارة عن أقراص فموية مخصصة لعلاج القطط المصابة بالتهاب الصفاق المعدي، والتي أثبتت فعاليتها الكبيرة في دعم علاج مختلف أنواع التهاب الصفاق المعدي السنوري لدى القطط.

**٣٠ قرص**  
 (below 30 °C).

**الجرعة وطريقة الاستخدام:**  
يُوصى بإعطاء أقراص موڤي-جي إس-٤٤١٥٢٤ على مدة قاربة أو بعد ساعتين من تناول الطعام. يمكن إعطاء الأقراص مباشرةً في فم القطط باستخدام أداة إعطاء الأقراص، أو يمكن سحق الأقراص وخلط المسحوق مع كميةليلة من الماء والطعام الرطب. لا تخلط الأقراص مع كامل الطعام. يمكن تقديم الطعام لقططك لمدة ساعة إلى ساعتين بعد إعطاء الأقراص.

من المهم علاج القطة لمدة ٨٤ يوماً والانتظار حتى تموت جميع الفيروسات الموجودة بشكل طبيعي قبل إيقاف العلاج.

يوضح الجدول التالي كيفية استخدام موڤي-جي إس-٤٤١٥٢٤ لقطتك بجرعة ١٥ ملغم من جي إس-٤٤١٥٢٤ لكل كيلوغرام من وزن الجسم لمدة ١٢ أسبوعاً متالية: