



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

Beta-Lactam

Amoxicillin - Move 20 %



For treatment of gastrointestinal, respiratory and urinary tract Infections

INDICATIONS:

Amoxicillin-Move %20 is a broad-spectrum penicillin against both gram positive and gram-negative bacteria, used for treatment of gastrointestinal, respiratory and urinary tract infections caused by amoxicillin sensitive microorganisms, such as *Campylobacter* spp., *Clostridium* spp., *Corynebacterium* spp., *E.coli*, *Erysipelothrix* spp., *Haemoius* spp., *Pasteurella* spp., *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp., and *Streptococcus* spp. in calves, sheep, goats and poultry.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 100 gm per 200 - 100 liters of drinking water for 5 - 3 days.
Calves, sheep and goats: 5 gm per 100 kg of body weight twice daily for 5 - 3 days.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:
Amoxicillin trihydrate 200 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

For meat:
Calves, Sheep and goats: 8 days.
Poultry: 3 days.
Not for use in poultry producing eggs for human consumption.



1kg /100gm




(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

NEW

أموكسيسيالين - موفي ٢٠٪



لعلاج التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسى والجهاز البولى

الخصائص العلاجية والاستطبابيات:

أموكسيسيالين موفي ٢٠٪ هو بنسلين واسع الطيف ضد كل من الجرام موجبة وجرام سالبة، يستخدم لعلاج التهابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسى والجهاز البولى التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة الحساسة للأموكسيسيالين، مثل كامبيلوباكتر، كلوستريديوم، كورينيبياكتيريوم، إي كولي، إريسيبيلوثرىكس، هيمويوس، باستوريلا، السالمونيلا، المكورات العنقودية والمقدية في العجول والأغنام والماعز والدواجن.

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الدواجن: ١٠٠ غرام لكل ١٠٠٠-٢٠٠ لتر من مياه الشرب لمدة ٥-٣ أيام.
العجول والأغنام والماعز: ٥ كغم من وزن الجسم مرتين يومياً لمدة ٥-٣ أيام.

التركيبة :

كل ١ غم يحتوى على:
أموكسيسيالين تراي هيدرات ٢٠٠ ملغم

فترة السحب :

اللحوم:
العجول والأغنام والماعز: ٨ أيام
الدواجن: ٣ أيام.
لا يستخدم في الدواجن المنتج لليبيض
للإستهلاك البشري.

١ كيلو / ١٠٠ غرام

(أقل من ٣٠ درجة مئوية)