



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Sniper shott



>



Cat



Dog

>

Insect Acaricid Drops

INDICATIONS:

Sniper shott is used against :Fleas (Cetnocephalus spp.), Lice (Linoganthus setosus), Ticks (Dermacentor spp., Ixodes spp., Rhipicephauls spp., Sareoptes scabiei). For prevention and treatment of flea allergic dermatitis in dogs and cats .

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

For external use only.

Apply the product directly to the skin, the drug should applied on the intact dry skin on the place out of the reach of pets to lice off, deploying wool in the area of the spine between the shoulders blades, in the area of the neck,ensuring direct contact with the skin of the inner surface of the ear as given doses below:

Animals weight	Dose (ml)	Ampoules number
Dogs		
1 – 10 Kg	0.5 – 1 ml	1
10 – 20 Kg	1.2 – 2 ml	1 - 2
20 – 30 Kg	2.3 – 3.0 ml	2 – 3
30 – 50 Kg	3.4 – 4.0 ml	3 – 4
Cats		
1 – 3 Kg	12 – 20 Drops	–
Above 3 kg	1.5 ml 1.5 ml	1.5

CONTRAINDICATIONS:

Do not use the drug for the sick and exhausted animals, animals during pregnancy and lactation, puppies and kittens up to 10 weeks of age, the dogs weighing up to 1 kg and animals sensitive to the components of the drug.

PRECAUTION:

During product application it is prohibit to smoke, drink and eat. After application it's needed to carefully wash hands with soap and use a regenerative cream. In case of accidental skin contact or mucous membranes, it should wash it flowing water, in the case of ingestion- visit doctor. During 48 hours after application its prohibit to wash and stroke an animal.

COMPOSITION:

Each 1 ml contain:

Fipronil 100 mg



4 Ampoule



(below 30°C)




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

سنايبر شوت



>



Cat



Dog

>

قطرات مبيد حشري ومضاد للأكاروسات

الاستخدامات:

يستخدم سنايبر شوت ضد: البراغيث والقمل والقراد الطفيلي .
وللوقاية والعلاج من التهاب الجلد التحسسي الناجم عن البراغيث في الكلاب والقطط .

الجرعة وطريقة الاستعمال:

للاستخدام الخارجي فقط .

يطبق الدواء على الجلد مباشرة ، يجب تطبيق الدواء على الجلد الجاف في مكان بعيد عن الحيوانات الأليفة
ليتساقط القمل، على خط الوسط الظهري، خلف قاعدة الرقبة بين الكتفين بحيث يتلامس المنتج مباشرة مع
الجلد، جلد السطح الداخلي للأذن حسب الجرعات في الأسفل:

وزن الحيوان	الجرعة (مل) الكلاب	عدد الأمبولات
١ - ١٠ كغ	١٠٠.٥ مل	١
١٠ - ٢٠ كغ	٢٠١.٢ مل	٢-١
٢٠ - ٣٠ كغ	٣٠٢.٣ مل	٣-٢
٣٠ - ٥٠ كغ	٤٠٣.٤ مل	٤-٣
٣٠ - ١ كغ	٢٠٠.١٢ نقطة	-
أكثر من ٣ كغ	١.٥ مل	١.٥

موانع الاستعمال:

لا يستخدم هذا الدواء للحيوانات المريضة والمراهقة، وفي الحيوانات أثناء الحمل والرضاعة، والجراء
والقطط حتى عمر ١٠ أسابيع، والكلاب التي يصل وزنها إلى ١ كغم والحيوانات الحساسة لمكونات الدواء.

المحاذير والاحتياطات:

خلال تطبيق هذا الدواء، يُمنع التدخين والشرب والأكل. بعد تطبيق هذا الدواء يجب غسل اليدين بعناية
بالصابون واستخدام كريم مجدد. في حالة ملامسة الجلد أو الأغشية المخاطية عن طريق الخطأ، يجب غسله
بالماء الجاري ، وفي حالة البلع - قم بزيارة الطبيب. خلال ٤٨ ساعة بعد التطبيق يحظر غسل الحيوان
ومداعيته.

التركيب:

كل ١ مل يحتوي على:
فيبرونيل ١٠٠ ملغم



٤ أمبولات



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)